



S. GIORGIO DI NOGARO (Udine) - Loc. Fontanive




La località di rinvenimento del materiale litico oggetto di questa nota è situata nella Bassa pianura friulana, sul confine dei comuni di S. Giorgio di Nogaro e di Porpetto, nei campi denominati Fontanive, a circa m. 7 s.l.m. e a pochi chilometri dal mare. Dal nome si può dedurre la presenza di risorgive. Il materiale, ora depositato presso il Museo Friulano di St. Naturale di Udine, è stato rinvenuto nel corso di diversi anni dal sig. L. Canciani di S. Giorgio. Dalla stessa zona provengono alcune punte foliate depositate presso vari Musei della regione.

Descrizione:

- Bulino semplice a uno stacco laterale (n. 1), B semplice a due stacchi obliqui (n. 2)
- Grattatoio frontale lungo (n. 3), grattatoio frontale corto, ad unghia (n. 4)
- Becco (n.5)
- Punta a dorso bilaterale, microlitica (n. 6)
- Dorso troncatura (n. 7), frammento di strumento a dorso (n. 8), microbulino distale (n. 9)
- Geometrici; romboide, con asportazione del piquant triédre (n. 11), triangolo scaleno allungato a piccola troncature corta e ritocco sul terzo lato (n. 10)
- Ogiva foliata F5, (N. 14), tranciante trasversale F6, (n. 13) (BAGOLINI B. 1970)
- Raschiatoio (n. 15)






23



24



25

— Nuclei a lamelle (nn. 16,18,19,20,21,23,24), nucleo a schegge (n. 17)

— Acciarino (n. 22)

— Scheggia con cortice inciso (n. 25).

La località può rappresentare notevole interesse per la presenza di elementi, anche se sporadici, che caratterizzano ben precisi periodi. In particolare il triangolo scaleno allungato indica un momento antico del mesolitico, del quale non si aveva traccia finora nel

Friuli, tantomeno nella Bassa Friulana, ma solo nelle grotte del Carso Triestino. Si può inoltre identificare meglio questo periodo per la presenza della punta a dorso bilaterale microlitica, del grattatoio ad unghia, dei piccoli nuclei a lamelle. Al neolitico antico si riferiscono il romboide, il microbulino, il grattatoio lungo, il frammento di dorso troncaturo, mentre in un periodo che comprende la fase finale del neolitico all'età del bronzo si collocano l'ogiva foliata ed il tranciante trasversale.

F. Bressan